

# Ordonnance Collective

Application de mupirocin intranasal (Bactroban <sup>md</sup> )	N°:	OC-182
	Page :	1 de 2
	Émise le:	2017-02-17
	Révisée le :	2024-10-07
	Prochaine révision :	2027

Professionnels habilités
Infirmières et infirmiers

Secteurs d'activité visés
<ul style="list-style-type: none"> <li>Unités de soins et services</li> <li>Clinique ambulatoire de chirurgie cardiaque</li> </ul>

Clientèle visée
Usagers en préparation à une chirurgie cardiaque

Indications
<ul style="list-style-type: none"> <li>Usager connu porteur <i>Staphylococcus aureus</i> résistant à la méthicilline (SARM)</li> <li>Usager qui présente un test positif au dépistage nasal de <i>Staphylococcus aureus</i> sensible à la méthicilline (SASM) ou de SARM</li> <li>Usager n'ayant pas de résultat de dépistage nasal de SASM à son dossier</li> </ul>

Contre-indications
Allergie au mupirocin

Interventions diagnostiques ou thérapeutiques
<p>Pour toutes les situations suivantes, l'administration du mupirocin est à réaliser <b>la même journée que l'application des lingettes de chlorhexidine 2 %</b> selon la méthode de soins « Préparation de la peau avec savon antiseptique (douche préchirurgicale) ».</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><u>Au jour 5 précédant la date prévue de chirurgie :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Appliquer mupirocin 2 % intranasal 2 fois par jour pour 5 jours. Poursuivre l'administration pour 5 jours consécutifs même si la chirurgie est reportée à une date ultérieure (voir point 3 pour les détails) ;</li> <li>Appliquer l'onguent (de la taille d'un pois) à l'aide d'une tige montée dans chacune des narines. Par la suite, demander à l'usager de presser le côté des narines ensemble et de masser délicatement par la suite durant 1 minute. Éviter de se moucher durant les 15 minutes suivant l'application.</li> </ul> </li> <li><u>Si la décolonisation n'a pas été débutée à partir du 5<sup>e</sup> jour précédant la chirurgie :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Débuter ce jour et poursuivre pour 5 jours consécutifs. Poursuivre l'administration pour 5 jours consécutifs même si la chirurgie est reportée à une date ultérieure (voir point 3 pour les détails).</li> </ul> </li> <li><u>Si l'usager a terminé l'administration du mupirocin et que la chirurgie est reportée à une date ultérieure :</u> <ol style="list-style-type: none"> <li><u>Moins de 16 jours :</u> débuter la veille de la chirurgie et poursuivre pour 5 jours.</li> <li><u>Entre 16 et 21 jours :</u> débuter au jour 16 après la dernière application du mupirocin pour une durée de 5 jours consécutifs.</li> <li><u>Plus de 21 jours :</u> Recommencer l'application 5 jours avant la date de chirurgie prévue tel que mentionné au point 1.</li> </ol> </li> </ol> <p><b>Pour toutes ces situations, si un autre produit intranasal est appliqué :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Appliquer l'autre produit en premier et par la suite le mupirocin</li> <li>Attendre au moins 15 minutes avant d'administrer le mupirocin à la suite de l'administration de l'autre produit</li> </ol> <p>Après à l'application du mupirocin, attendre 4 heures avant d'appliquer tout autre produit.</p>

# Ordonnance Collective

Application de mupirocin intranasal (Bactroban <sup>md</sup> )	N°:	OC-182
	Page :	2 de 2
	Émise le:	2017-02-17
	Révisée le :	2024-10-07
	Prochaine révision :	2027

## Activités réservées

- Évaluer la condition physique et mentale d'une personne symptomatique;
- Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques, selon une ordonnance;
- Administrer et ajuster des médicaments ou d'autres substances, lorsqu'ils font l'objet d'une ordonnance.

## Références

Outils cliniques : aucun

Bibliographie : aucune

### Élaborée par :

M<sup>me</sup> Bianka Paquet Bolduc, chef de service en prévention des infections

M<sup>me</sup> Véronique Paradis, conseillère-cadre aux activités cliniques

D<sup>r</sup> Jean-François Roussy, Microbiologiste-infectiologue

### Personnes consultées (dernière version) :

D<sup>r</sup> Philippe Gervais, Microbiologiste-infectiologue

M<sup>me</sup> Bianka Paquet Bolduc, chef de service en prévention des infections

M<sup>me</sup> Rosalie Demers-Bouchard, conseillère-cadre aux activités cliniques (i), secteur médecine cardiaque

### Validée par (dernière version) :

*Charles Morasse*

D<sup>r</sup> Charles Morasse

Directeur des services professionnels

2024-10-07

Date

### Approuvée par :

*Robert De Larochellière*

D<sup>r</sup> Robert De Larochellière

Président du CMDP

2024-10-07

Date

Date d'entrée en vigueur : 2024-10-17

Révisions antérieures : 2018-02-26